



29ª Informação do GT Estenfiliose


1 de setembro de 2021

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 34** (23 a 30 de agosto) os resultados da monitorização foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios / semana / cm² / pomar **diminuiu ligeiramente** nos pomares da Sobrena e Alcobaça, **manteve-se** no pomar da Maiorga e **aumentou ligeiramente** no pomar da Picanceira (gráfico 1).


Gráfico 1



O pomar da Sobrena foi o que apresentou **maior** número médio de conídios por centímetro quadrado (38,9), seguiram-se os pomares da Maiorga (15,3), da Picanceira (13,8) e de Alcobaça (6,9).

Número médio de ascósporos


O número médio de ascósporos / semana / cm² / pomar **manteve-se** nos pomares da Sobrena, da Picanceira e de Alcobaça, **diminuiu** no pomar da Maiorga (gráfico 2).

**Gráfico 2**

O **maior** número médio de ascósporos por centímetro quadrado foi observado nos pomares da Sobrena (0,1), da Picanceira (0,1) e da Maiorga (0,1). O pomar de Alcobaça **não apresentou** ascósporos.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) / semana / cm^2 / pomar **diminuiu ligeiramente** nos pomares da Sobrena, da Maiorga e de Alcobaça e **aumentou ligeiramente** no pomar da Picanceira (gráfico 3).


Gráfico 3



O pomar que apresentou **maior** número médio de esporos por centímetro quadrado foi o da Sobrena (39,0), seguiram-se os pomares da Maiorga (15,4), da Picanceira (13,8) e de Alcobaça (6,9).

Comparação do número médio de esporos de 2021 em relação à média dos quatro anos de monitorização


Comparando a média de 2017 até 2020* do número médio de esporos / semana / cm² / pomar (gráfico 4) com a da **mesma semana** (semana 34) de **2021** (gráfico 3), verifica-se que os valores **deste ano** são **superiores** 1,6 vezes no pomar da Sobrena, 1,3 vezes no pomar da Maiorga, **inferiores** 1,1 vezes no pomar da Picanceira e **semelhantes** no pomar de Alcobaça.



***Nota:** a média do número médio de esporos / semana / cm² / pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos dois anos de monitorização (2019 e 2020), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Percentagem média de folhas com sintomas de estenfiliose

A percentagem média de folhas com sintomas de estenfiliose / semana / pomar continuou a **aumentar** em **todos** os pomares monitorizados (gráfico 5).

**Gráfico 5**

Esta semana, o pomar que apresentou a **percentagem mais elevada** foi o da Sobrena (55,9%; **+2,2%**), seguiram-se os pomares da Picanceira (53,8%; **+0,7%**), de Alcobaça (54,4%; **+1,5%**) e da Maiorga (35,3%; **+0,4%**).

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose



Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

