



15ª Informação do GT Estenfiliose

14 de maio de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 19** (5 a 12 de maio) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Picanceira, **aumentou moderadamente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (9,8), seguido pelos pomares da Sobrena (3,5), da Picanceira (1,3) e de Alcobaça (1,0).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Picanceira e **manteve-se** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 2).

Os pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Picanceira, **aumentou moderadamente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (9,8), seguido pelos pomares da Sobrena (3,5), da Picanceira (1,3) e de Alcobaça (1,0).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 19) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores 5,0 vezes** nos pomares da Sobrena e da Picanceira; **3,7 vezes** no pomar de Alcobaça e **1,7 vezes** no pomar da Maiorga.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose por lançamento jovem, por semana, por pomar, **aumentou acentuadamente** no pomar de Alcobaça e **manteve-se** nos pomares da Sobrena, da Picanceira e da Maiorga (gráfico 5).

O pomar de Alcobaça apresenta o **maior** número médio de folhas com sintomas (1,3), seguido pelos pomares da Picanceira (0,6) e da Sobrena e da Maiorga (0,1).




Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose, por ramo, por semana, por pomar.

Estados fenológicos dos pomares

No dia **12 de maio**, as árvores monitorizadas encontravam-se nos seguintes estados fenológicos:

	Baggiolini	BBCH
Sobrena	I	71
Picanceira	I	71
Maiorga	I	71
Alcobaça	H	69

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

