



28ª Informação do GT Estenfiliose

13 de agosto de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 32** (4 a 11 de agosto) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena, **aumentou ligeiramente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (3,6), seguido pelos pomares da Maiorga (2,9), da Sobrena (1,3) e de Alcobaça (1,1).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **manteve-se** em todos os pomares monitorizados (gráfico 2).

Os pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena, **aumentou ligeiramente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (3,6), seguido pelos pomares da Maiorga (2,9), da Sobrena (1,3) e de Alcobaça (1,1).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 32) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 14,5 vezes nos pomares da Sobrena; 4,9 vezes no pomar de Alcobaça; 3,5 vezes no pomar da Maiorga e 2,2 vezes no pomar da Picanceira.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose por lançamento jovem, por semana, por pomar, **diminuiu ligeiramente** no pomar de Alcobaça, **manteve-se** no pomar da Sobrena, **aumentou ligeiramente** no pomar da Maiorga e **aumentou moderadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 5).

O pomar da Sobrena apresenta o **maior** número médio de folhas com sintomas (16,5), seguido pelos pomares de Alcobaça (12,3), da Picanceira (7,5) e da Maiorga (5,8).




Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose, por ramo, por semana, por pomar.

Percentagem de frutos com sintomas de estenfiliose

A percentagem de frutos com sintomas de estenfiliose, por semana, por pomar, **manteve-se** em todos os pomares monitorizados (gráfico 6).




Gráfico 6 - Percentagem de frutos com sintomas, por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresenta a **maior** percentagem de frutos com sintomas (55,6%), seguido pelo pomar da Picanceira (6,9%) e da Sobrena (5,6%). O pomar de Alcobaça **não registou sintomas de estenfiliose** nos frutos.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose



Entidades Financiadoras desta informação:

