



39ª Informação do GT Estenfiliose

30 de outubro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 43** (20 a 27 de outubro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **aumentou acentuadamente** em todos os pomares (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (2,5), seguido pelos pomares da Picançeira (1,9), da Sobrena (1,2) e de Alcobaça (0,6).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **manteve-se** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos restantes pomares (gráfico 2).

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,3), seguido pelos pomares da Maiorga (0,2) e da Picançeira (0,1). O pomar de Alcobaça **não registou a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **aumentou acentuadamente** em todos os pomares (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (2,7), seguido pelos pomares da Picançeira (1,9), da Sobrena (1,5) e de Alcobaça (0,6).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 43) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 4,5 vezes no pomar da Sobrena; 2,6 vezes no pomar de Alcobaça, 1,5 vezes no pomar da Maiorga e 1,3 vezes no pomar da Picanceira.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

