

23ª Informação do GT Estenfiliose


28 de junho de 2023

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 25** (19 e 26 de junho) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm²/semana/pomar **aumentou ligeiramente** no pomar da Maiorga, **aumentou moderadamente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Picanceira (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar



O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (27,8), seguido pelos pomares da Maiorga (14,4), da Picanceira (11,5) e de Alcobaça (2,8).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar **manteve-se** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga (gráfico 2).





Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar





Os pomares da Sobrena e da Maiorga apresentaram o **maior** número de ascósporos/cm² (0,1), os restantes pomares monitorizados não registaram a presença de ascósporos.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) /cm²/semana/pomar **aumentou ligeiramente** no pomar da Maiorga, **aumentou moderadamente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Picanceira (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






O pomar que apresenta **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) é o pomar da Sobrena (27,9), seguido pelos pomares da Maiorga (14,6), da Picanceira (11,5) e de Alcobaça (2,8).

Comparação do número médio de esporos de 2023 em relação à média dos seis anos de monitorização (2017 a 2022)

Comparando a média de 2017 até 2022* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da **mesma semana** (semana 25) de 2023 (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 2,8 vezes no pomar de Alcobaça e 1,2 vezes nos pomares da Picanceira e da Maiorga e **superiores** 1,2 vezes no pomar da Sobrena.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2022) com 2023



***Nota:** A média do número médio de esporos/cm²/semana/pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos quatro anos de monitorização (2019 a 2022), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose / lançamento jovem / semana / pomar na **semana 26** (26 de junho) **aumentou ligeiramente** nos quatro pomares monitorizados (gráfico 5).





Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas/ramo/semana/pomar





O pomar da Picanceira foi o que apresentou o **maior** número de folhas com sintomas de estenfiliose (5,6), seguido dos pomares da Sobrena (4,7), da Maiorga e de Alcobaça (4,4).

Percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose

A percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose / semana / pomar na **semana 26** (26 de junho) **manteve-se** no pomar de Alcobaça e **aumentou ligeiramente** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 6).

Gráfico 6 - Percentagem de frutos com sintomas/semana/pomar





Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O pomar da Maiorga foi o que apresentou a **maior** percentagem de frutos com sintomas (58,3%), seguiram-se os pomares da Sobrena (47,9%), da Picanceira (12,5%) e Alcobaça (2,1%).

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

