



33ª Informação do GT Estenfiliose

17 de setembro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 36** (8 a 15 de setembro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga e **aumentou acentuadamente** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (164,0), seguido pelos pomares da Sobrena (55,0), da Picanceira (23,3) e de Alcobaça (10,1).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **manteve-se** em todos os pomares monitorizados (gráfico 2).

Os pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga e **aumentou acentuadamente** nos restantes pomares monitorizados.




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (164,0), seguido pelos pomares da Sobrena (55,0), da Picanceira (23,3) e de Alcobaça (10,1).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 37) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **superiores** 29,4 vezes nos pomares da Maiorga; 4,3 vezes no pomar da Sobrena; 3,8 vezes no pomar da Picanceira e 3,3 vezes no pomar de Alcobaca.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose por lançamento jovem, por semana, por pomar, **aumentou ligeiramente** em todos os pomares monitorizados (gráfico 5).




Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose, por ramo, por semana, por pomar.

O pomar da Sobrena apresenta o **maior** número médio de folhas com sintomas (19,8), seguido pelos pomares de Alcobaça (14,3), da Picanceira (11,5) e da Maiorga (8,6).

A responsabilidade do conteúdo desta
informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

[Signature]

**Entidades Financiadoras desta
informação:**

