



35ª Informação do GT Estenfiliose

1 de outubro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 39** (22 a 29 de setembro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Picanceira, da Maiorga e de Alcobaça e **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (4,2), seguido pelos pomares da Sobrena (4,0), de Alcobaça (1,7) e da Picanceira (1,6).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, diminuiu acentuadamente nos pomares da Sobrena e da Picanceira, **manteve-se** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Maiorga (gráfico 2).

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,1). Os restantes pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Picanceira, da Maiorga e de Alcobaça e **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (4,2), seguido pelos pomares da Sobrena (4,0), de Alcobaça (1,7) e da Picanceira (1,6).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 39) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 4,9 vezes no pomar da Picanceira; 3,7 vezes no pomar da Sobrena e 1,4 vezes nos pomares da Maiorga e de Alcobaça.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

A monitorização do número médio de folhas com sintomas de estenfiliose deixou de ser realizada nesta fase, uma vez que a queda natural de folhas impossibilita a continuidade da avaliação.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

