



37ª Informação do GT Estenfiliose

15 de outubro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 41** (6 a 13 de outubro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** no pomar da Sobrena, **diminuiu moderadamente** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e **diminuiu ligeiramente** no pomar da Maiorga (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (1,7), seguido pelos pomares da Sobrena (1,6), da Maiorga (1,3) e de Alcobaça (0,8).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Picanceira e **manteve-se** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Sobrena (gráfico 2).

Os pomares da Sobrena e da Picanceira apresentaram o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,1). Os restantes pomares

monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** no pomar da Sobrena, **diminuiu moderadamente** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e **diminuiu ligeiramente** no pomar da Maiorga (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (1,8), seguido pelos pomares da Sobrena (1,7), da Maiorga (1,3) e de Alcobaça (0,8).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 41) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 3,3 vezes no pomar da Sobrena; 2,3 vezes no pomar da Maiorga, 1,9 vezes no pomar de Alcobaça e 1,1 vezes no pomar da Picanceira.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

