



41ª Informação do GT Estenfiliose

12 de novembro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 44** (3 a 10 de novembro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça e **diminuiu moderadamente** nos pomares da Sobrena e da Picanceira (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (0,5), seguido pelos pomares da Picanceira e da Maiorga (0,3) e de Alcobaça (0,1).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** no pomar de Alcobaça, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga, **manteve-se** no pomar da Sobrena e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 2).

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,5), seguidos pelos pomares da Sobrena e da

Maiorga. O pomar de Alcobaça **não registou a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena e **manteve-se** no pomar da Picanceira (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

Os pomares da Sobrena e da Picanceira apresentaram o **maior** número médio de esporos/cm² (0,8), seguido pelos pomares da Maiorga (0,5) e de Alcobaça (0,1).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da mesma semana (semana 45) de 2025 (gráfico 4), verifica-se que os valores deste ano são inferiores 9,5 vezes no pomar de Alcobaça; 3,3 vezes no pomar da Maiorga, 2,6 vezes no pomar da Sobrena e 1,6 vezes no pomar da Picanceira.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com a média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

